

# Tabagisme en région Paca


Colloque régional LSST – 04 février 2020

Lauriane Ramalli – Santé publique France Paca- Corse

# Prévalence et caractéristiques du tabagisme en Paca


# Tabagisme quotidien adultes 18-75 ans - 2017

- Inférieur aux autres régions\*\*
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions\*\*



- Données issues du baromètre santé 2017
- Moyenne nationale = 26,9 %  
21% à 32% suivant les régions
- Paca = tabagisme le plus élevé de France
  - Ensemble = 32,2 %
  - Femmes = 29 %
  - Hommes = 35,5 %

# Evolution du tabagisme adultes 18-75 ans



- - 4 points en France entre 2016-18 = 1,6 millions de fumeurs en moins en 2 ans
- Stable en Paca entre 2016-2017...



# Tabagisme quotidien adolescents (17 ans) - 2017

## Tabagisme quotidien

## Tabagisme intensif (au moins 10 cig/jour)

- Inférieur aux autres régions\*
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions\*

- Inférieur aux autres régions\*
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions\*



Moyenne France métropolitaine

25,1 %


Moyenne France métropolitaine

5,2 %


5

# Tabagisme chez les femmes enceintes - 2016

## Consommation de tabac avant la grossesse



## Consommation de tabac au 3<sup>ème</sup> trimestre



# Facteurs associés au tabagisme quotidien en Paca

	%	OR	IC95%
<b>Sexe</b>	*		
Hommes (n=820)	34,9	1,2	[1,0-1,5]
Femmes (réf.) (n=978)	28,1	1,0	
<b>Âge</b>	***		
18-30 ans (n=322)	38,3	3,8***	[2,6-5,4]
31-45 ans (n=478)	41,7	5,1***	[3,6-7,2]
46-60 ans (n=496)	33,1	2,8***	[2,0-4,0]
61-75 ans (réf.) (n=502)	13,2	1,0	
<b>Revenus par unité de consommation</b>	***		
1er tercile (faible) (n=531)	36,0	1,7***	[1,3-2,3]
2nd tercile (n=560)	36,6	1,6***	[1,2-2,2]
3ème tercile (élevé) (réf.) (n=619)	18,9	1,0	
NSP/Refus (n=88)	35,6	1,6	[0,9-2,7]
<b>Diplôme</b>	***		
< Bac (n=633)	36,9	1,8***	[1,4-2,4]
Bac (n=400)	31,7	1,3	[1,0-1,8]
> Bac (réf.) (n=759)	22,5 %	1,0	

\*\*\*p<0,001 ; \*\* p<0,01 ; \*p<0,05

OR : odds ratio ; IC95% : intervalle de confiance à 95%. Résultats issus d'une régression logistique multivariée.

Champ : France métropolitaine, population des 18-75 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Baromètre de Santé publique France 2017 (Santé publique France).

# Quantité de tabac et dépendance en Paca - 2017

- Quantité de tabac fumé
  - 13,4 cigarettes en moyenne par jour  $\approx$  moyenne nationale
  - 70,3 % fument de façon intensive (+ 10 cigarettes/jour)  $\approx$  moyenne nationale
- Niveau dépendance des fumeurs quotidiens
  - forte dépendance = 17,2 % ( $\approx$  moyenne nationale)
  - moyenne dépendance = 40 % ( $\approx$  moyenne nationale)
  - faible dépendance = 42,8 % ( $\approx$  moyenne nationale)
  - Augmentation du niveau dépendance avec l'âge (46-60 et 61-75 ans)

# Usage de la cigarette électronique en Paca - 2017

- « Vapoteurs » quotidiens = 3,5 % (≈ moyenne nationale)
- Plus d'utilisateurs chez :
  - les hommes (4,2% vs 2,8% chez les femmes)
  - les ex-fumeurs (5,8 % vs 4,4 % fumeurs)
  - les 31-45 ans (7,2%) suivie des 46-60 ans (2,9%)
- Vapotage quotidien chez personnes n'ayant jamais fumé = 0,1 %
- Au niveau national, 700 000 arrêts depuis plus de six mois en lien avec e-cigarette depuis mise sur le marché en France\*

\* <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans>


# Morbidité et mortalité associées au tabac en région Paca

# Tabagisme comme cancérogène certain


- Tabac = cause directe ou facteur favorisant de 17 localisations de cancers
  - 8/10 cancers des poumons
  - 7/10 cancers des voies aérodigestives supérieures (bouche, larynx, pharynx, œsophage)
  - 5/10 cancers de la vessie
  - Impliqué dans développement cancers foie, pancréas, estomac, rein, col de l'utérus, ovaires, sein, côlon, rectum, leucémies.

# Incidence cancer du poumon par région – 2007-2016

## Femmes



## Hommes





\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.

\* Différence statistiquement significative entre le taux régional standardisé d'incidence et celui de la France métropolitaine au seuil de 5%.

Champ : France entière (hors La Réunion et Mayotte).

Source : Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).

# Incidence cancer poumon par département – 2007-2016



\* Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.


\*\* Taux d'incidence significativement différent du taux de France métropolitaine.

Champ : Région Paca.


Source : Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).

# Mortalité par cancer du poumon par région – 2007-2014

## Femmes



## Hommes





° Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.

\* Différence statistiquement significative entre le taux régional standardisé d'incidence et celui de la France métropolitaine au seuil de 5%.

Champ : France entière (hors La Réunion et Mayotte).

Source : Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).

# Mortalité cancer poumon par département – 2007-2014



\* Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.

\*\* Taux de mortalité significativement différent du taux de France métropolitaine.

Champ : Région Paca.


Source : Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).

# Conclusion

- Prévalence tabagisme élevée en Paca
- Pas de tendance à la baisse observée
- Impact majeur de la prévalence du tabagisme chez les femmes sur la morbidité et mortalité lié au tabagisme.



# Merci pour votre attention



Lauriane Ramalli

[lauriane.ramalli@santepubliquefrance.fr](mailto:lauriane.ramalli@santepubliquefrance.fr)

**EXTRA DIAPOS**

# Lieux d'achat du tabac entre 2014 et 2018

# Prix moyen pondéré courant paquet 20 cigarettes au 1<sup>er</sup> janvier 2018, pays de l'Union européenne voisins de la France



→ Étudier les lieux d'achat du tabac par les fumeurs de la métropole à partir des enquêtes de Baromètre de Santé publique France 2014, 2017 et 2018

ÉTUDES ET ENQUÊTES

TABAC

Santé publique France

### LIEUX D'ACHAT DU TABAC ENTRE 2014 ET 2018 : RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

**POINTS CLÉS**

- En 2018, parmi les adultes, 72,8% des fumeurs de cigarette (manufacturiers ou malins) ont déclaré avoir acheté leur tabac dans un commerce de détail en France lors de leur dernier achat. Cette proportion est stable par rapport à 2014 (70,7%) mais en diminution par rapport à 2017 (81,3%).
- La part de ceux qui ont réalisé leur dernier achat dans un pays limitrophe était de 16,4% en 2018 (proportion non significativement différente de celle observée en 2014 ou 2017), ce taux étant plus élevé dans les régions Grand-Est et Île-de-France.
- En 2018, parmi les adultes, 44,3% des fumeurs de cigarettes ont déclaré avoir acheté du tabac à l'étranger au moins une fois au cours des douze mois précédant l'enquête.

**CONTEXTE**

La lutte contre le tabagisme est un enjeu majeur de santé publique et de nombreuses mesures ont été implémentées récemment en France (5). Parmi elles, les augmentations de prix constituent un levier puissant pour faire diminuer la prévalence du tabagisme (2, 3). En France, le prix annuel moyen du paquet de 20 cigarettes le moins cher est passé de 4,76 euros en 2017 à 6,05 euros en 2018, mais est resté stable jusqu'aux augmentations de mars 2018 portant le prix de paquet le moins cher à 7,42 euros (4) (Figure 1). L'objectif annoncé par les pouvoirs publics est d'obtenir un prix national du paquet de cigarettes à 10 euros en novembre 2020.


Tous les États ne pratiquent pas cette politique d'augmentation des prix de façon identique et il existe de fortes disparités géographiques, en Europe notamment (6). En particulier, le prix moyen du tabac en France continentale est supérieur à celui dans les pays limitrophes (Carte 1). Par conséquent, une partie des fumeurs résidant en France continentale s'approvisionnent à l'étranger pour des raisons économiques (6, 7). L'achat de tabac à l'étranger pour la consommation personnelle est d'ailleurs autorisé (avec à un certain seuil).

L'objectif de cette synthèse est de présenter les indicateurs relatifs aux lieux d'achat du tabac par les fumeurs de la métropole à partir des enquêtes Baromètre de Santé publique France 2014, 2017 et 2018.

1. Le prix moyen par paquet de 20 cigarettes (prix de vente au public) en France continentale en 2018 est de 6,05 euros. Ce prix est supérieur à celui des pays limitrophes (à l'exception de l'Espagne) et inférieur à celui de l'Allemagne.

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/lieux-d-achat-du-tabac-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france>

# Part de fumeurs de cigarettes ou tabac à rouler ayant effectué leur dernier achat de tabac dans un pays limitrophe, selon la région, en 2018



- 16,4% ont effectué leur dernier achat dans pays limitrophe
- Part très différente d'une région à l'autre avec taux d'environ 50% en Grand-Est et Haut-de-France alors que seulement 10% en PACA
- Achats transfrontaliers augmentent entre 2017 et 2018
- Contrebande représente 6% quantité tabac consommé en France en 2010.